

බෝංචි එළවළු

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



රූපමය කාඩ් පත්



ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ හිටරෙදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

www.safe.doa.gov.lk



බෝවේ වගාව

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



හාක්ෂණික දායකත්වය

- ❖ ආචාර්ය ජී. එච්. රණවීර - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ එම්. එස්. ඩබ්. ප්‍රනාන්දු - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ කේ. පුෂ්පාංජි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සීතාවලිය
- ❖ එච්. ඒ. එස්. එන්. හෙට්ටිආරච්චි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සීතාවලිය
- ❖ ටී. කේ. ඒ. අයි. හප්පි - ප්‍රාදේශීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ඔණාරිවෙල
- ❖ ආචාර්ය ජේ. ජී. මාර්කින් - පළිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය, පේරාදෙණිය


සැකසුම

- ❖ ජී. එස්. ජී. තෙන්නකෝන් - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව
- ❖ කේ. ඒ. යූ. එන්. එන්. ඔණාරිවර - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පේරාදෙණිය
2024

බෝංචි කැරල් විදින පණුවා




හානි වූ කරලක්

කීටයන් කරල ආහාරයට ගැනීම නිසා අක්‍රමවත් හෝ රවුම් කීදරු ඇතිවේ. කීදරු අසල අපද්‍රව්‍ය දැකිය හැකිය.




කීටයා

කීටයාගේ ශරීරය ක්‍රීම් පැහැතිය. කළු තිත් පේළි දෙකක් ඇත. කීටයා කරල් තුළට ඇතුළු වී එහි කොටස් ආහාරයට ගනී.



කීටයා (පුෂ්ප මත)

කීටයන් පුෂ්ප (මල් කැකුළු) ද ආහාරයට ගනී. වගාවක පුෂ්ප හටගන්නා අවස්ථාවේදී හානිය ආරම්භ විය හැක.



සුහුඹුල් සලබයා

පියාපත් දිගහැර ඇති විට ම.ම. 20ක 30ක පමණ වේ. පියාපත් ලා දුඹුරු පැහැති අතර හුදු පැහැයට හුරු රේඛා ඇත.

බෝංචි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බෝංචි කරල් විදින පණුවා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
එටොලෙන්ප්‍රොක්ස් 100 g/l EC	මි.ලී. 24
නොවලිප්‍රොක්ස් 100 g/l EC	මි.ලී. 16
ක්ලෝල්ලොක්ස් 50 g/l EC	මි.ලී. 16
ලැබෙන්ඩියාමයිඩ් 24% WG	ග්‍රෑම් 02
ක්ලෝරන්ට්‍රානිලිප්‍රොල් 200 g/l SC	මි.ලී. 05
ක්ලෝරන්ට්‍රානිලිප්‍රොල් 20% + තයාමෙතොක්සාම් 20% WG	ග්‍රෑම් 2.4
තයොක්සිකාබ් 375 g/l EC	මි.ලී. 32
ට්‍රන්ඩෝක්සිකාබ් 150 g/l EC	මි.ලී. 6.5

* 50% මල් පිපීමත් සමගම නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් යෙදීම.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ හානි වූ කරල් එකතුකර විනාශ කිරීම.
- ❖ අස්වනු නෙළීමෙන් පසු හානිවූ කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම.
- ❖ කොහොඹ නිස්සාරකය භාවිතා කිරීම.
- ❖ සලබයන් විකර්ශනය සඳහා නිපදවා ඇති විශේෂිත කහ බල්බ ඇටවුම භාවිතා කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්ධනය කිරීම.



බෝංචි මැස්සා



හානිවූ ශාකයක්

කීටයන් කදව ඇතුළු වී හානි කිරීමත් කෝෂගත වීමත් නිසා ශාක කහ පැහැයට හැරී මැලවී යයි. කඳු කපා වැලව්ව කීටයන් හෝ කෝෂ දැකිය හැක.



කීටයන්

ක්‍රීම පැහැයක් ගන්නා අතර ම.ම. 3 ක් පමණ දිගය. කඳු පාදස්ථයේ කෝෂ ගත වේ.



සුනම්මා

ම.ම. 3 ක් පමණ වේ. දිලිසෙන කළු පැහැයක් ගනී. විනිවිද පෙනෙන පියාපත් ඇත. ප්‍රධානව බීජ පැළෑටිල පළමු පත්‍ර දෙක අතර බිත්තර දමයි. මල් පිපෙන අවස්ථාවේදී පත්‍ර මත බිත්තර දමයි.

බෝංචි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බෝංචි මැස්සා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

කාබෝකල්ලාන් 200 g/l EC

මි.ලී. 48

- * බීජ ප්‍රතිකාර කර නොමැතිවීම් පැලයේ කොළ 2 ක් මතු වනවිට (දින 07) යෙදීම
- * අවශ්‍ය නම් සති 2කට පසුව නැවත යොදන්න
- * හානිය දරුණු නම් මල් පිපෙන අවස්ථාවේදී නැවත යොදන්න

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ හානිවූ පැළ ගලවා විනාශ කර දැමීම


වළක්වා ගැනීම

- ❖ බීජ ප්‍රතිකාරයක් ලෙස තයාමෙතොක්සාම් 70% WS ග්‍රෑම් 1.5 ක් ජලය මි.ලී. 10 ක දියකර බීජ කි.ග්‍රෑ. 1 ට එකතු කර පැය 24ක් තබා සිටුවීම
- ❖ අමතර මුල් සෑදීම උත්තේජනය සඳහා පැලයේ පාදස්ථ ප්‍රදේශයට පස් මුදුන් කිරීම
- ❖ පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- ❖ බෝග මාරුව සිදු කිරීම



වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

පත්‍ර කෘතීමය



කෘතී වූ පත්‍ර

කීටයා පත්‍ර මධ්‍යයේ මෘදුස්තරය කා දැමීම නිසා පැත්තල ඉරි මෙන් සුදු පැහැති රටා ඇතිවේ. රටා කෙළවර කොප ගත වේ.



කෘතී වූ පත්‍ර (පත්‍ර අවිඝ්ටාව)

කා දැමීම නිසා ඇති වූ රටා අවිඝ්ටාවට හැරේ.



සුහුඹුල් මැස්සා

ම.ම. 2ක් පමණ වේ. දිලිසෙන කළු පැහැයක් ගනී. පියාපත් දෙක අතර ප්‍රදේශය, මුහුණ සහ ශරීරයේ ශරීර පැත්ත කහ පැහැතිය. පත්‍ර තලය මත බිත්තර දමයි.

බේරිංචි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පත්‍ර කහිඳින

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

★ මෙම ප්‍රතිරෝධකයාට නිර්දේශිත කෘමිනාශක නැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ හානියේ මුල් අවස්ථාවේදීම හානිකර කළ පත්‍ර ඉවත්කර විනාශ කිරීම
- ❖ හානියේ මුල් අවස්ථාවේදීම කොහොඳ නිස්සාරකය භාවිතා කිරීම
- ❖ රෙපෙල පාලකයින් යොදා ගැනීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම
- ❖ වගා ක්ෂේත්‍රය වටා කෘමි බාධක දැලක් ගැසීම හෝ බාධක වැටක් ඉදිකිරීම
- ❖ බෝග මාරුව සිදුකිරීම
- ❖ නිසි පරිදි පස සකස් කිරීම
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම



මයිටාවන්



හානි වූ පත්‍රයක්

ලපටි පත්‍රවල ගටි පැත්තේ සිටි ගුෂ් උරා බිමෙන් පත්‍ර ගටි අතට නැගෙයි.



හානි වූ පත්‍රයක් (යටිපැත්ත)

පත්‍රවල ගටිපැත්ත දුම්රු පැහැයක් ගනී.



හානි වූ පත්‍ර

හානිය අධික වූ විට විකෘති වේ. කහ පැහැයට හුරු දුම්රු පැහැයක් ගනී.



සුහුඹුල් මයිටාවන්

ම.ම. 0.4-0.5 පමණ වේ. පියවි ඇතට දැකීම අසීරුය. කහ පැහැයට හුරු දුම්රු පැහැයක් ගනී.

බෞද්ධ ව්‍යාප්ත රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

මයිටාවන්

රසායනික කාලනය - නිර්දේශිත මයිටානාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

ඇඹවෙන්න 18 g/l EC

මි.ලී. 10

වෙනත් කාලන ක්‍රම

- ❖ විසුරුම් ජල සම්පාදනය භාවිතා කිරීම
- ❖ භානියේ මුල් අවස්ථාවේදීම භානිකල කළ පත්‍ර ඉවත්කර විනාශ කිරීම
- ❖ භානිය මුල් අවස්ථාවේදීම කොහොඹ නිස්සාරකය භාවිතා කිරීම
- ❖ පෙප්ට් පාලකයින් යොදා ගැනීම
- ❖ බෝග සනීපාරක්ෂාව හා නඩත්තුව පවත්වා ගැනීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම



බෝංචි කොඳුළු කහ විවිභූ වෛරසය



මුල් අවස්ථාවේදී ආකෘතින පත්‍රයක්

ශාක වලට සති 3 - 4 කාලයේදී නොමේරූ පත්‍රවල විසිරුණු කුඩා කහ පැහැති පුළුල් ඇතිවේ.



පසු අවස්ථාවේ ආකෘතින පත්‍ර

පැළලම් විශාලව පසු කාලීනව දුඹුරු පැහැවී පත්‍ර මියයයි.



ආකෘතින ශාකයක්

වර්ධනය බාලවේ. පත්‍ර කුඩාවේ. පත්‍ර වල දිග අඩුවේ.



සුදුමැස්සා

ම.මී. 1-2 පමණ වේ. සුදු පැහැති. රෝග වාහකයා වේ. ආකෘතින ශාක වලින් ගුණ උරා බී නිරෝගී ශාක වල ගුණ උරාබීමෙන් වෙඩිරස් රෝගය පතුරුවයි.

බෝංචි වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බෝංචි පොල්ලු කහ විවිඳු වෛරසය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක
(වාහකයා පාලනය සදහා)

කෘමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
-----------	---------------------------------------

ක්ලෝරන්ට්‍රානිලිප්‍රෝල් 20% + තයාමෙතොක්සාම් 20% WG	ග්‍රෑම් 4.8
---	-------------

තයෝසයික්ලොම් (හයිඩ්‍රජන් ඔක්සෙල්ට්) 50% SP	ග්‍රෑම් 40
--	------------

සල්ෆොක්සාල්ෆෝර් 50% WG	ග්‍රෑම් 05
------------------------	------------

පයිමෙට්‍රොක්සීන් 50% WG	ග්‍රෑම් 08
-------------------------	------------

ඇසබ්රැක්ටීන් 50 g/l EC	මි.ලී. 16
------------------------	-----------

* බෝංචි සිටුවා දින 10 යේ සිට දින 10 ක කාලාන්තරයකින් මාරුවෙන් මාරුවට කුඩා කරල අවස්ථාව තෙක් යෙදීම සඳහා

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ රෝගී පැල වහාම ගලවා විනාශ කිරීම
- ❖ බෝංචි සිටුවීමට සති 03 කට පෙර කේෂ්‍රය වටා ආවරණයක් / බාධකයක් යෙදීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ බෝග අවශේෂ ආර්ථික අස්වැන්න නෙලීම නතර කළ වහාම කේෂ්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම
- ❖ නිරෝගී ගුණාත්මක බීජ භාවිතා කිරීම
- ❖ යායේ ගොවීන් එකවර වගාකිරීම
- ❖ වල් පැල වලින් තොරව ක්ෂේත්‍රය පිරිසිදුව තබාගැනීම
- ❖ බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම (බීජ කිලෝ ග්‍රෑම් 01 ක් සඳහා කෘසර් ග්‍රෑම් 3.5 ක් ජලය මි.ලී. 10 ක මිශ්‍ර කර මිශ්‍රණය හොඳින් බීජ සියල්ලෙහි තැවරෙන ලෙස කලවම්කර පැය 24 ක් තබා සිටුවීම)



වඩා විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

කෝණාකාර පත්‍ර ලප රෝගය



මුල් අවස්ථාවේදී ආකෘතින පත්‍රයක්

දීලිරයක් මගින් ඇති කරයි. පත්‍ර නාරටි වලට මායිම් වූ කෝණාකාර ලප පත්‍ර තලයේ ඇතිවේ. ආරම්භයේදී අළු දුඹුරු පැහැති ලප පසුව තද දුඹුරු පැහැ ගනී. මේරු පත්‍ර වල රෝග ලක්ෂණ මුලින් දිස් වේ.



පසු අවස්ථාවේ ආකෘතින පත්‍රයක්

ලප ක්‍රමයෙන් විශාල වී එකතු වී පත්‍රයේ සැලකිය යුතු කොටසක් විශලී මැරී යයි.



ආකෘතින කරල්

ආකෘතින අධික විට රතු දුඹුරු පැහැති ලප කරල් වල ද ඇතිවේ.

බේරිංචි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බෝංචාකාර පත්‍ර ලූප රෝගය

රසායනික කාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ත්‍රොපිකොනකොල් 250 g/l EC	මි.ලී. 06*
හෙක්කාකොනකොල් 50 g/l EC	මි.ලී. 06*
හෙක්කාකොනකොල් 50 g/l SC	මි.ලී. 06*
ත්‍රොපිනෙබ් 70% WP	ග්‍රෑම් 32*
මෙහිරාම් 55% + පයිරක්ලොක්ප්‍රොබින් 5% WG	ග්‍රෑම් 32
ටෙබ්‍රිකොනකොල් 250 g/l EW	මි.ලී. 06*
ටෙබ්‍රිකොනකොල් 200 g/l + ඇකොක්සිප්‍රොබින් 120 SC	මි.ලී. 5.6

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම
- ❖ නියමිත පරතරයෙන් සිටුවීම

- වර්ෂාව අධික කාලයක් නම් සංස්ථානික (*) හා ස්පර්ශක දිලීරනාශක මාරුවෙන් මාරුවට දින 7 ක කාලාන්තරයෙන් රෝගය පැතිරීම අඩු වන තෙක් ඉසීම



කෘෂි ප්‍රවෘත්ති (පැළතුපැනෝස්) රෝගය



ආසාදිත පත්‍රයක්

දීලීරයක් නිසා ඇතිවේ. ගංඹාල රතු පැහැය මිශ්‍ර තද දුඹුරු පාට ලප පත්‍ර ගව් පැත්තේ නාරටි වල දැකිය හැක.



ආසාදිත පත්‍රයක් (පසු අවස්ථාව)

දිගටි ගිළුණු ලප ආකාරයට හැරේ. ආසාදනය උග්‍ර අවස්ථාවේදී පත්‍ර නටුවේ, කටේ හා කරලු වල ලප ඇතිවේ.



ආසාදිත කරලු

කරලු වල ඇති වන ලප ගිළුණු වෘත්තාකාර වේ. තෙත් කාලගුණයක් ඇතිවිට රෝග පැහැති බීජාණු ආසාදිත ලප වල දැකිය හැක.



ආසාදිත ශාකයක්

කරලුවලට ආසාදනය වීමෙන් අස්වැන්න සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වේ.

බේරිංචි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ඩාඩ් පුල්ලි (ඇන්ඩ්‍රැක්ෂෝස්) රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ත්‍රෝපිකොනකොල් 250 g/l EC	මි.ලී. 06*
හෙක්කාකොනකොල් 50 g/l EC	මි.ලී. 06*
හෙක්කාකොනකොල් 50 g/l SC	මි.ලී. 06*
ටෙබ්‍රිකොනකොල් 250 g/l EW	මි.ලී. 06*
ත්‍රෝපිනෙබ් 70% WP	ග්‍රෑම් 32
මෙතිරාම් 55% + පයිරක්ලොක්ෆොබීන් 5% WG	ග්‍රෑම් 32

- මුල් අවස්ථාවේම යෙදීමෙන් කරල් වලට වන හානිය වළක්වා ගත හැක.
- වර්ෂාව අධික කාලයක් නම් සංස්ථානික (*) හා ස්පර්ශක දිලීරනාශක මාරුවෙන් මාරුවට දින 7 ක කාලාන්තරයෙන් රෝගය පැතිරීම අඩු වන තෙක් ඉසීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ ආකාදනය නොවූ බීජ භාවිතා කිරීම.
- ❖ නිවැරදි කාලයට වගා කිරීම.
- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම
- ❖ අස්වැන්න තෙලීමෙන් පසු ඉතිරිවන හෝ හානිවූ ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කිරීම



ඒල්ටිකෝරිකා පත්‍ර ලප රෝගය



ආකෘති පත්‍රයක් (මුල් අවස්ථාව)

මුලින්ම කුඩා දුඹුරු පාට අක්‍රමවත් හැඩති ලප මේරූ පත්‍රවල ඇතිවේ. එම ලප ක්‍රමයෙන් විශාල වී වලඟකාර මෘදු ස්වාභාවයක් ගනී.



ආකෘති පත්‍රයක් (පසු අවස්ථාව)

අධික ආසාදනයකදී විශාල වූ ලප එකතු වී පත්‍ර කහ පැහැ වී, විශේෂ හැලී යයි.

බේරිංග් වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ඩිල්ටිෂෙරියා පත්‍ර ලප රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

★ මෙම රෝගය සඳහා නිර්දේශිත රසායනික නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

❖ ආසාදිත පත්‍ර ඉවත් කිරීම

වළක්වා ගැනීම

❖ නියමිත පරතරයෙන් සිටුවීම

❖ ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව



මළුකඩ රෝගය



ආකෘතින පත්‍රයක් (යටි පැත්ත)

කුඩා සුදු පැහැයට හුරු කහ පැහැති ඉහළට එකවුනු ලප යටි පැත්තේ ඇතිවේ.



ආකෘතින පත්‍රයක් (උඩු පැත්ත)

සුදු පැහැයට හුරු කහ පැහැති ලප ලෙස දිස්වේ.



ආකෘතින පත්‍රයක් (පසු අවස්ථාව)

සුදු පැහැයට හුරු කහ පැහැති ලප මධ්‍යයෙන් ක්‍රමානුකූලව විශාල වී රතු දුඹුරු පාටට හැරේ.

බේරිංජි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

වළඤා ටෝෆය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය	ජලය ලීටර් 1ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ප්‍රොපිකොනොසෝල් 250 g/l EC	මි.ලී. 06
හෙක්සාකොනොසෝල් 50 g/l EC	මි.ලී. 06
හෙක්සාකොනොසෝල් 50 g/l SC	මි.ලී. 06
ටෙබුකොනොසෝල් 250 g/l EW	මි.ලී. 06
ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP (ඉහත දිලීරනාශකයන් ගෙදීමෙන් පසු යොදන්න.)	ග්‍රෑම් 32
මෙතිරාම් 55% + පයිරක්ලොප්‍රොබික් 5% WG	ග්‍රෑම් 32
ටෙබුකොනොසෝල් 200 g/l + ඇකොක්සිප්‍රොබික් 120 SC	මි.ලී. 6.4

* අධික ලෙස ආසාදිත පත්‍ර ඉවත් කිරීමෙන් පසු දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න.


වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ ගැඹුරට සී සැම.
- ❖ රෝගය සහිත වගාවක තිබූ ආධාරක කොටු භාවිතා නොකිරීම.
- ❖ බෝග මාරුව සිදුකිරීම.
- ❖ පරණ බෝංචි වගාවන් අස්වැන්න නෙලා අවසන් වූ විගස ගලවා ඉවත්කිරීම.



වඩා විස්තර තද්දා මෙම QR කේතය සබැඳි කරන්න

බෝංචි මුල් කෑණුවීමේ හා මැලෑවීමේ රෝගය



ආකෘදින පත්‍රයක්

මල් පිපීම හෝ කරල ඇතිවීම ආරම්භ වන විට මේරු පත්‍රවල නාරටි අතර කහ පැහැ වේ.



ආකෘදින ශාකයක්

පසුව පත්‍රයම කහ පැහැ වී හැලී යයි. ඉහළ පත්‍රවලට ක්‍රමයෙන් පැතිරී ශාකය මිය යයි.



ආකෘදින ශාකයක මුදන් මුලෙහි දික් කඩක්

ශාකයේ මුදන් මුල ඇතුළත රතු දුඹුරු පැහැයට හැරේ. අධික භානි අවස්ථාවල දිලීර පාලයක් දැකිය හැක.

බෝංචි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බෝංචි මුල් කුණුවීමේ හා මැලුවීමේ රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය

ජලය ලීටර් 50ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

තයෝලනේට් මෙතිල් 50% + නිරාම් 30% WP ග්‍රෑම් 50

තයෝලනේට් මෙතිල් 70% WP ග්‍රෑම් 30

නිරාම් 80% WP ග්‍රෑම් 70

ෆ්ලූටොලැනිල් 50% WP ග්‍රෑම් 30

කාබෙන්ඩිසිම් 500 g/l SC මි.ලී. 35

කාබෙන්ඩිසිම් 50% WP ග්‍රෑම් 35

- * පස තෙත් වන ලෙස මි.ලී. 50 ක් පමණ බීජ සිටු වන වලකට බීජ සිටුවන විට සහ පැලයේ මුල හා අවටට බීජ සිටුවා දින 14 පසුව රෝගය වලක්වා ගැනීම සඳහා යෙදීමට
- * රෝග ලක්ෂණ මතු වන විට ස්ථානීයව වර්ග මීටර් 10 ප්‍රමාණයකට යෙදීම සඳහා

වළක්වා ගැනීම

- ❖ පෙර කන්නයේ ඉතිරිවූ ශාක කොටස් විනාශකිරීම
- ❖ බිම් සැකසීමේදී අළුතූ කාබනික පොහොර හා කර දහසියා යෙදීම.
- ❖ බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම (බීජ කි. ග්‍රෑ. 1 කට තයෝලනේට් මෙතිල් 50% + නිරාම් 30% WP හෝ තයෝලනේට් මෙතිල් 70% WP ග්‍රෑම් 2ක සිටුවීමට පැය 24 කට කලින් බීජ වලට දමා ජලය ස්වල්පයක් එක්කර මිශ්‍ර කිරීම).





**ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ හිමරේදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

www.safe.doa.gov.lk