

එමිට්ටු එතෑච්

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



රූපමය කාඩ් පත්



ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ නිවැරදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

www.safe.doa.gov.lk



එම්බ්‍රු එරාචි

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



තාක්ෂණික දායකත්වය

- ❖ එම්. එස්. ඩබ්. ප්‍රනාන්දු - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ ටී. කේ. ඒ. අයි. හප්පි - ප්‍රාදේශීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ඔණ්ඩාරවෙල
- ❖ එච්. ඒ. එස්. එන්. තෙට්ටිආරච්චි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සීතාවලිය
- ❖ කේ. පුෂ්පාංජි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සීතාවලිය
- ❖ ආචාර්ය ජී. එච්. රණවීර - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ ආචාර්ය ජේ. පී. මාර්කිංහ - පළිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය, පේරාදෙණිය

සැකසුම

- ❖ ජී. එස්. පී. තෙන්නකෝන් - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව
- ❖ කේ. ඒ. යූ. එන්. එන්. ඔණ්ඩාර - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පේරාදෙණිය
2024

බටු කැරට් හා ගෙඩි විදින්නා



හානිවූ ගෙඩි හා කරට්

මැලේවුනු බටු කරට් වගාවේ දැකිය හැක. මැලේවුනු කරට් ආසන්නයේ පහලින් කුඩා තිත්ක් වැනි සිදුරක් දැකිය හැක.

කීටයා

මේරු කීටයන් රෝස පැහැයට හුරු මු.ම. 20 පමණ වේ. කීටයින් ප්‍රථම රිකිලි තුලට හෝ එළ තුලට ඇතුළු වී එහි කොටස් ආහාරයට ගනී. පිට කරන කළු පැහැති අපද්‍රව්‍ය වලින් සිදුරු පිරී පැවතිය හැකිය.

සුහූමිලා

මු.ම. 10-12 ක් පමණ විශාල සුදු පැහැති පියාපත් මත දුඹුරු පැහැති ලප සලකුණු ඇත. පත්‍ර යටි පැත්තේ, රිකිලි මත, මළ මත හෝ ගෙඩි වල නටුව ආසන්නයේ බිත්තර තැන්පත් කරයි.

විවිධ චෝරා රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බටු ජාරට් හා ගෙඩි විදින්නා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ක්‍රෝමලොනොසයිඩ් 50 g/l SC	මි.ලී. 32
ක්ලෝරන්ට්‍රිනිලිපරොල් 200 g/l SC	මි.ලී. 03
ෆ්ලුබෙන්ඩියමයිඩ් 24% WG	ග්‍රෑම් 08
ෆ්ලුබෙන්ඩියමයිඩ් 20% WG	ග්‍රෑම් 10
එටොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 100 g/l EC	මි.ලී. 24
ඩෙල්ටාමෙත්‍රින් 25 g/l EC	මි.ලී. 10
ලැම්ඩා සයිනෙලොක්‍රින් 50 g/l SC	මි.ලී. 12

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ හානි වූ ගෙඩි හා මැලේ කඩා වැටී රිකිලි මැලවුණු ස්ථානයේ සිට අඟලක් පමණ පහලින් කපා විනාශ කර දැමීම.
- ❖ පෙරමෝන උගුල් භාවිතා කිරීම.
- ❖ සලඹයන් විකර්ෂණය සඳහාම නිපදවා ඇති විශේෂිත ඇටවුම් භාවිතා කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ සිටුවීමට පෙර, පෙර කන්නයේ සියළුම ශාක අවශේෂ විනාශ කිරීම.
- ❖ බෝග මාරුව අනුගමනය කිරීම (සොලනෙසියස් කුලයට අයත් නොවන බෝග සමඟ)
- ❖ වගා ක්ෂේත්‍රය වටා කෘමි බාධක දැලක් ගැසීම හෝ බාධක වැටක් ඉදිකිරීම



පීඨ මකුණා



හානි වූ ශාක

සුභුමුලන් හා ශිෂුවන් අතුස්ථයේ ඇති පත්‍ර වලින් යුෂ උරාබීම නිසා පත්‍ර ඇඹරී රැලි වැරි විකෘති වේ. මල වලට හානි වූ විට එල ඇතිවීම අඩු වේ.



හානි වූ පත්‍රයක්

පීඨමකුණන් විසින් ක්‍රාවය කරනු ලබන සීනිමය ද්‍රව්‍ය මත දිලීර ප්‍රභේද වර්ග ඇති වී කළු පැහැ වේ. මෙය බෝගයේ ප්‍රභාසංස්ලේෂණය හෙවත් ආහාර නිෂ්පාදනය අඩු කරයි.



පීඨමකුණා

සුදු පැහැ, ඉරිමය ද්‍රව්‍යයකින් වැසී ඇති ඕවිලාකාර හැඩයක් සහිත පීඨ මකුණන් ම.ම. 4-5ක් විශාල වේ. සුභුමුලන් හා ශිෂුවන් පත්‍ර, ලපරි ශාක කොටස් හා එල මත යුෂ උරාබෙයි.

විවිධ ඵලාභි රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ජිට් මතුණා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

ඉම්බික්ලොප්‍රිඩ් 200 g/l SL

මි.ලී. 16

ඕජරොනිල් 50 g/l SC

මි.ලී. 16

කයමෙනොක්කම් 25% WG

ග්‍රෑම් 08

ඇසිටැම්ප්‍රිඩ් 200 g/l SL

මි.ලී. 16

වෙනත් පාලන ක්‍රම


- ❖ පීටිමකුණන් සහිත ශාක කොටස් කපා විනාශ කිරීම
- ❖ පත්‍රවල යටි පැත්ත හොඳින් සෙදි යන සේ ජලය යෙදීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්ධනය කිරීම



සුද මැස්සා



සුද මැස්සන්

සුද පැහැ පියාපත් සහිත මි.මි. 1-2 ක් පමණ විශාල වේ. බෝගයේ පත්‍රවල යටිපැත්තේ සිටි යුෂ උරා බීම සිදු කරයි. මේ හේතුවෙන් පත්‍ර කහ පැහැයට හැරී පත්‍ර නාරටි පැහැදිලිවීමට පටන් ගනී. ශාකයේ වර්ධනය බාල වේ. හානිය අධික වූ විට පත්‍ර හැළී යයි. විශේෂ කාල වලදී මොවුන්ගේ ගහණය සීග්‍රයෙන් වැඩි වේ.

කළු පැහැවූ පත්‍රයක්

මොවුන් විසින් ස්‍රාවය කරනු ලබන සීනිමය ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් පත්‍ර මත පුස් වර්ග සෑදී ඒවා කළු පැහැ වේ.

විවිධ වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

සුදු මැස්සා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

★ මේ සඳහා පලිබෝධනාශක නිර්දේශ කර නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

❖ ගහනය වැඩි විට කහ පැහැති ඇලෙන උගුල් භාවිතා කිරීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ සිටුවීමට පෙර, පෙර කන්නයේ සියලුම ශාක අවශේෂ විනාශ කරන්න.
- ❖ වගා ක්ෂේත්‍රය වටා කෘමි බාධක දැලක් ගැසීම හෝ බාධක වැටක් ඉදිකිරීම
- ❖ රිදී පැහැති ආලෝක පරාවර්තිත පොලිතින් චක්‍රාත් යෙදීම
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම



පත්‍ර දැල් බැදින්නා



පත්‍ර දැල් බැදින්නාගේ නානි

පත්‍ර දැලකින් මෙන් එකිනෙක රෝල් කර ඇලවා එ තුලට වී පත්‍ර ආහාරයට ගනී. රෝල් වී ඇති පත්‍ර තිබීමත් එ අසල කළු පැහැයෙන් ඔවුන්ගේ අපද්‍රව්‍ය තිබීමෙන් හානිය හඳුනාගත හැකිය. මල් හා අංකුරවලටද හානිකරයි.



සුහුඹුල් සලබයා

සුහුඹුල් සලබයා කහ පැහැතිය. මි.මි. 20 ක් පමණ විශාලය. පත්‍ර මත ගැහැණු සලබයා විසින් බිත්තර පොකුරු වශයෙන් තැන්පත් කරයි.

විවිධ ඵලාභී රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පත්‍ර දැල් බිඳින්නා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

★ මේ සඳහා ප්‍රමාදායක නිර්දේශ කර නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ භානිය පාලනය සඳහා දැල් බැඳ ඇති පත්‍ර කොටස් කපා විනාශ කර දමන්න.
- ❖ සලබයන් විකර්මණය සඳහා නිපදවා ඇති විශේෂිත කහ පැහැති බල්බ උගුල් භාවිතා කරන්න.



වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

මයිටාවා



හානි වූ පත්‍රයක යටිපත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්වයින් පළමුව පත්‍ර දිළිසෙන සුළු ස්වභාවයක් ගන්නා අතර ක්‍රමයෙන් පත්‍ර තලය ගොරොසු වී රතු දුඹුරු පැහැයට හැරී විශේෂී වැරේ. ළපටි පත්‍ර වලට හානි සිදු කළ විට පත්‍ර යටි පැත්තට කුඩයක් ආකාරයට නැගේ.



හානි වූ ගෙඩියක්

හානිය උග්‍ර වීම එම වලටද හානි සිදුකරයි. දුඹුරු පැහැති ගුරුතුළු ස්වභාවයක් එම මතුපිට දක්නට ලැබේ. මල් පිපෙන කාලවලදී හානිය ඇති වීම මල් හැලී යයි.



මයිටාවන්

මයිටාවන් පියවි ඇසට පැහැදිලිව නොපෙනේ. පාද ග්‍රහණ 4 ක් සහිතය. රතු පැහැති ග්‍රහා කුඩා පීච්ච වන මොවුන් පත්‍රයේ යටි පැත්තේ ඝණාචාස ලෙස පිවිත්වෙමින් ශාකයෙන් ශ්‍රී ලා බෝයි.

විවිධ වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

මයිටාවා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

හෙක්සිතයොකොක්ස් 10% EC

මි.ලී. 24

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ විසුරුම් ජල සම්පාදනය භාවිතා කිරීම.
- ❖ භානිය මුල් අවස්ථාවේදීම භානිකල කළ පත්‍ර ඉවත්කර විනාශ කිරීම.
- ❖ භානිය මුල් අවස්ථාවේදීම කොහොඹ නිස්සාරකය භාවිතා කිරීම.
- ❖ ජෛව පාලකයින් යොදා ගැනීම.
- ❖ බෝග සනීපාරක්ෂාව හා නඩත්තුව පවත්වා ගැනීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ සිටුවීමට පෙර, පෙර කන්නයේ සියළුම ශාක අවශේෂ විනාශ කරන්න.
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්ධනය කිරීම.



හමුල / හඳුන්වා ඇණවිටේ රෝගය



ආසාදිත ශාකයක්

දිවා කාලයේ ශාක මැලේයයි. පසු අවස්ථාවේ ස්ථිරවම මැලේවේ. මුල් කුණු වී යයි. සුදු හෝ දුඹුරු දිලීර පාල හෝ අඛණ්ඩ වැනි චක්‍රාකාර පසට ආසන්නව කළු දැක්වෙනු ඇත.



ආසාදිත ශාකයක පත්‍රයක්

ආසාදිත ශාකවල පත්‍ර කහ පැහැය වී මැළවී යයි.



ආසාදිත ශාකයක කඳෙහි හරස්කඩ

කළු තුළු දුඹුරු පැහැය වේ.

විවිධ වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පාමුල / පාදස්ථ කුණුවීමේ රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

- ★ ආසාදන ඇති ස්ථානවලට පමණක් ස්ථානීයව නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය

ජලය ලීටර් 05ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

කැප්ටන් 50% WP

ග්‍රෑම් 06

තිරාම් 80% WP

ග්‍රෑම් 07

තයිලොනෙට් මිතයිල් 50% + තිරාම් 30% WP

ග්‍රෑම් 05

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ ආසාදිත ශාක, පස් සමග ගලවා ඉවත් කිරීම.
- ❖ ජල වහනය වැඩිදියුණු කිරීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ ගැඹුරට සීඝ්‍රමෙන් ආසාදිත පස් සුර්යශාලෝකයට නිරාවරණය කිරීම.
- ❖ පැල සිටුවීමේදී මුල්වලට සිදුවන හානිය අවම කිරීම.
- ❖ බීජ පැල ක්ෂේත්‍රයේ රෝපණය කිරීමේදී මුල්වලට හානිවීම වැළැක්වීම.
- ❖ රෝගය සදහා පත්‍රිනොවන හෝග (කෘෂිපරේශ් කුලයේ කුලයට අයත් හෝවා, රාඬු, නෝකෝල්, වැනි හෝග) සමග හෝග මාරුවක් සිදුකිරීම.
- ❖ බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම (බීජ පැල කිරීමට ප්‍රථම බීජ කිලෝ 1ක් සඳහා කැප්ටන් 50% WP ග්‍රෑම් 4 හෝ තිරාම් 80% WP ග්‍රෑම් 5 ක් හෝ තයිලොනෙට් මිතයිල් 50% + තිරාම් 30% WP ග්‍රෑම් 4 ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර කිරීම)



වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

බැක්ටීරියා හටු මැරීමේ රෝගය



ආසාදිත ශාකයක්

ආරම්භක රෝග ලක්ෂණ වන්නේ තනි අතු හෝ අතු කිහිපයක් සුළු වශයෙන් මැලවීමයි.



ආසාදිත ශාකයක්

දින කිහිපයකට පසු මුළු ශාකයම හදිසියේ ස්ථිර ලෙස මැලවීයයි.



රෝගය හඳුනා ගැනීම

ආසාදිත කොටස් කෙළවර කැපූ පෘෂ්ඨය පිරිසිදු ජලයේ ගිල්වූවිට සුදු පැහැති බැක්ටීරියා භාවයක් පිටවීම මගින් රෝගය හඳුනාගත හැක.



විවිධ වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බැෂට්ටියා හිටු වැරිච්චේ රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත රසායනික

★ මෙම රෝගය සඳහා නිර්දේශිත රසායනික නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ මුල් හා අවට පස් සමග ශාකය ගලවා පිළිස්සීම / ගැඹුරින් වලඳුම්ම.
- ❖ ජල වහනය වැඩිදියුණු කිරීම
- ❖ ආසාදිත ක්ෂේත්‍ර හරහා නිරෝගී ක්ෂේත්‍රයකට ජලය සැපයීමෙන් වලකීම
- ❖ ආසාදිත ක්ෂේත්‍රවල සිට ආසාදිත නොවන ක්ෂේත්‍ර වෙත ජලය / ගොවිපල උපකරණ / මෙවලම් ගෙනයාමෙන් වැළකී සිටීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ හෝග අවශේෂ විනාශකිරීම
- ❖ පසට හොඳින් දිරාපත් වූ කොම්පෝස්ට් හෝ ගොම පොහොර හෝ කර දහයිශා යෙදීම.
- ❖ ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය (අංජලී, පාදාගොඩ)
- ❖ හෝග මාරුවක් සිදුකිරීම (කෘෂිපරෙස් කුලයේ කුලයට අයත් හෝවා, රාඬු, නෝකෝල් වැනි හෝග) සමග.



පත්‍ර සිහින් වීචේ රෝගය



ආසාදිත ශාකයක්

කුඩා පත්‍ර ඇතිවීම, පැති අංකුර විශාල වන නමුත් ඒවායේ පත්‍ර නටු සහ කොළ කෙටි වන අතර, පරව අතර දුර අඩුවී ශාකයට පදාරු, පෙනුමක් ලබා දෙයි. කොළ පටු, මෘදු, සිනිඳු සහ කහ පැහැති වේ. ග්‍රෂ උරාබොන කෘමීන් පත්‍ර යටි පැත්තේ දැකගත හැකිය. බොහෝ විට මල් පිපීම සිදු නොවේ, නමුත් මල් හටගන්නේ නම් ඒවා කොළ පැහැ වේ. ගෙඩි හටගන්නේ කලාතුරකිනි. බලපෑමට ලක් වූ ශාක පල දරන්නේ නැත.



ආසාදිත ශාකයක්



ආසාදිත ශාකයක්

විවිධ වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පත්‍ර සිහින් වීචේ රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

- ★ මෙම රෝගය සඳහා නිර්දේශිත රසායනික නොමැත.
- ❖ රෝග වාහකයා (කීඩාවා) පාලනයට නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

ඇකටම්ප්‍රික් 20% SP

ග්‍රෑම් 16

ඇකටම්ප්‍රික් 200 g/l EC

ග්‍රෑම් 16

තයාමෙතොක්කම් 25% WG

ග්‍රෑම් 05

ඇකිලේට් 75% SP

ග්‍රෑම් 16

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ ආසාදිත ශාක උදුරා පුළුස්සා දැමීම.
- ❖ සිටුවීමට පෙර, පෙර කන්නයේ සියළුම ශාක අවශේෂ විනාශ කිරීම.
- ❖ වගා ක්ෂේත්‍රය වටා කෘමි බාධක දැලක් ගැසීම හෝ බාධක වැටක් ඉදිකිරීම (බඩවැරදීම).



වඩා විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

භෞමික ජංගමාරක්



ආසාදිත ගෙඩියක්

ආසාදිත ගෙඩි මත කුඩා, ගිළුණු අඳුරු පැළලුම් දිස්වන අතර පසුව එම ප්‍රදේශ කුණාටීම සිදුවේ. දිළිර වර්ධනය සමඟ පැළලුම්වල කේන්ද්‍රය දුඹුරු පැහැයේ සිට කළු පැහැයට හැරේ.



ආසාදිත කඳක්

ආසාදිත ශාක පත්‍ර, නටු සහ කඳ කොටස් මත කළු පැහැය දැර සහිත දුඹුරු පැහැති ලප ඇතිවේ.

විවිධ වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ආයුර්වේද උපකරණ

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

★ මෙම රෝගය සඳහා නිර්දේශිත රසායනික නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

❖ ආසාදිත ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කිරීම හා විනාශකිරීම.



විකි විකි සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

ඇච්ඡාකෝස් රෝගය



ආකෘති පත්‍රයක්

පත්‍රවල දුඹුරු පැහැය ලප ඇතිවේ.



ආකෘති ගෙඩියක්

එම මත රවුම් හැඩැති ගිළුණු ලප ඇතිවේ. මෙම පැළලම් මැද තඹ පැහැයේ සිට තැඹිලි පැහැයට වූ කළු පැහැති කේන්ද්‍රයේ මුදු දැකිය හැක.

විවිධ වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ඇඟවුණුබෝස් රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

මෙට්රාම් 50% + පයිරක්ලොක්ප්‍රොබීන් 5% WP ග්‍රෑම් 32

ෆ්ලූසිනාම් 500 g/l SC මි.ලී. 16

ක්ලෝරන්කැලොනිල් 500 g/l SC මි.ලී. 48

තයෝලනේට් මිනයිල් 70% WP ග්‍රෑම් 16

- ★ වර්ෂා කාලයේදී මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ සිටදින 7-10 කාල පරතරයක් ඇතිව දිලීරනාශක යොදන්න

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ නිරෝගී බීජ භාවිතා කිරීම
- ❖ පත්‍ර මත තෙතමනය අඩුකිරීම සඳහා හැකිතරම් විසිරුම් පල සම්පාදන ක්‍රමවලින් ඉවත්වීම
- ❖ ආසාදිත ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම හා විනාශකිරීම.
- ❖ සොලනෙස් කුලයේ හෝග හැර වෙනත් හෝග සමග හෝග මාරුවක් සිදුකිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ ආසාදනය නොවූ බීජ භාවිතා කිරීම.
- ❖ නිවැරදි කාලයට වගා කිරීම.
- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම.
- ❖ අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු ඉතිරිවන හෝ භානිවූ කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කිරීම



වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න



**ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ හිමරේදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

www.safe.doa.gov.lk