

අර්නාපල් එගාව

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



රූපමය කාඩ් පත්



ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ නිවැරදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

www.safe.doa.gov.lk



අර්තාපල් වගාව

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



තාක්ෂණික දායකත්වය

- ❖ කේ. පුෂ්පාංජි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සීතාවලිය
- ❖ ආචාර්ය ඩී. එච්. රණවීර - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ ටී. කේ. ඒ. අයි. හජ්ජි - ප්‍රාදේශීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ඔණාරිවෙල
- ❖ එච්. ඒ. එස්. එන්. හෙට්ටිආරච්චි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සීතාවලිය
- ❖ එම්. එස්. ඩබ්ලිව්. ප්‍රනාන්දු - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ ආචාර්ය ජේ. ඩී. මාර්කින් - පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය, පේරාදෙණිය

සකස්කළ

- ❖ ජී. එස්. ඩී. හෙන්නකෝන් - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව
- ❖ කේ. ඒ. යූ. එන්. එන්. ඔණාරිවර - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව




කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පේරාදෙණිය
2024

දඹ ඉපියා




හානි වූ පත්‍ර හා අලයක්

පත්‍ර අභ්‍යන්තර කොටස් ආහාරශීලී ගැනීම නිසා පත්‍ර තුළ උම් අැති වී පත්‍ර වියළී ගාම සිදුවේ. අංකුර හා කඳන් හානිවීමෙන් අංකුර මියයාම හා කඳන් කඩා වැටීමද සිදු වේ. අලයේ සිදුරු කරන ලද ස්ථානවල පීටකරන අපද්‍රව්‍ය දැකිය හැක. කපා බැලූ විට අක්‍රමවත් උම් අැත.




කීටයා

සුළු වශයෙන් රෝස හෝ කොළ පැහැති. වැඩුණු කීටයා දිග ම. මී. 15-20 දිගය. හිස තද දුඹුරු පැහැති වේ.



පිළා කෝෂය

තැඹිලි පැහැති වේ. ක්ෂේත්‍රයේ දී පත්‍රවල හා පහෙහිද දැකිය හැක. ගබඩාවේදී, අරතාපල් ආකන්ද මත කුඩා ,ආධාරක හෝ බිත්තියේ පැලුම් මත දැකිය හැකිය.



නුහුණු කලඹයා

අළු පැහැති ය. ම. මී. 10-15 පමණ වේ. සවස් කාලයේ වඩා සක්‍රීය වේ.

දේශීයවත් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ඇල ඉපිටා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

ක්ලෝරන්ට්‍රානිලිප්‍රෝල් 20% +
තයාමෙතොක්සාම් 20% WG

ග්‍රෑම් 05

පිරිමිලොස් මෙතිල් 500 g/l EC*

මි.ලී. 64

ඇසිටැම්ප්‍රිඩ් 20% SP*

ග්‍රෑම් 16

නොවැලිප්‍රෝන් 100 g/l EC*

මි.ලී. 16

* ගබඩාව පිරිසිදු කිරීමේදී යොදා ගන්න.

ගබඩාවේ දී සිදුවන හානිය කළමනාකරණය

- ❖ ක්ෂේත්‍රයේ දී අල ඉපිටාගේ හානිය රකින, තුවාල නොවූ, පස් වලින් තොර, අරතාපල් ආකන්ද ගබඩා කිරීම
- ❖ බීජ සඳහා අරතාපල් ආකන්ද ගබඩා කිරීමේදී අරතාපල් ආකන්ද කිලෝ ග්‍රෑම් 100 ක් සඳහා, තයොසයික්ලම් (හයිඩ්රජන් ඔක්සලේට් 50% SP) ග්‍රෑම් 40 ක් යොදා බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- ❖ අල ඉපිටාගේ සිටින බවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පෙරමොන්න උගුල භාවිතා කරන්න.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ හොඳින් ජල සම්පාදනය
- ❖ නියමිත කාලයේදී අස්වනු නෙලීම.

වළක්වා ගැනීම

ක්ෂේත්‍රයේ

- ❖ බීජ අල ගැඹුරින් සිටුවීම (සෙ. මි. 15 පමණ) හා පස් යොදා හොඳින් ආවරණය කිරීම.
- ❖ අල ඉපිටා හානි නොවූ ගුණාත්මක බීජ භාවිතා කිරීම.

ගබඩාවේ දී

- ❖ සුභුඹුල් සතුන්ට ඇතුළු වීමට නොහැකි වන සේ ගබඩා හොඳින් ආවරණය කරන්න හා කැඩී බිඳී ඇති ස්ථාන පිලිසකර කිරීම
- ❖ අරතාපල් ගබඩා කිරීමට පෙර ගබඩාව හා ගබඩා කරන කුඩා හොඳින් පිරිසිදු කිරීම
- ❖ පිරිසිදු කරන ලද ගබඩා කෘමිනාශක වලින් ප්‍රතිකාර කිරීම



පත්‍ර කෘතීන්



හානි වූ පත්‍රයක්

කීටයන් පත්‍ර අභ්‍යන්තර කොටස් ආහාරයට ගැනීම නිසා සිහින් සුදු පැහැති රටාවන් ඇති වේ.



කීටයා

ඉදිරි පෙදෙස උල් ස්වභාවයක් හා පසුපස මොට ස්වභාවයකින් යුක්ත මි.මි. 2-3 පමණ දිග වේ.



පිළා කෝෂය

කීට අවධිය අවසානය පත්‍ර මතුපිට පැමිණ පසට වැටී පිළා අවධියට පත්වේ. මි.මි. 1-2 පමණ දිගය, රතු දුඹුරු පැහැතිය.



නූතනුල් මැස්සා

මි.මි. 2 ක් පමණ වේ. කළු පැහැතිය. උදරයෙහි දිලිසෙන කහ පැහැති ලප ඇත.

දේශීයවත් වුවා වී රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පත්‍ර ඛනිජතා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

ඇකබ්රික්ටීන් 50 g/l EC

මි.ලී. 32

ඇඩම්බ්රික්ටීන් 18 g/l EC

මි.ලී. 10

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ කහ පැහැති ඇලෙන උගුල් ස්ථාපනය කිරීම
- ❖ ස්වාභාවික පරපෝෂිතයන් යොදා ගැනීම
- ❖ සමනළ අතංගුව භාවිතා කිරීම


වළක්වා ගැනීම

- ❖ ක්ෂේත්‍ර හොඳින් වල් පැලෑටි මර්ධනය කිරීම
- ❖ පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කර දැමීම
- ❖ ගැඹුරට සී සැම



වඩා විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

කීයන් පණුවා



හානියට ලක් වූ ශාකයක් හා ආකන්ධයක්

කීටයා ළපටි ශාක පොළව මට්ටමෙන් කපා දමයි. ගහනය අධික අවස්ථාවලදී පත්‍ර කා දමයි. ආකන්ද වර්ධනය වන අවධියේ දී ආකන්ධ වලට හානි කරයි.




කීටයා

සෙ.ම. 3 - 5 ක් දිග මා අළු, අළු දුඹුරු හෝ කළු පැහැතිය. බාධාකළු වීට C හැඩයට හැකිය. දිවා කාලයේදී පසෙහි හෝ අපද්‍රව්‍ය තුළ සැත වී කීට රාත්‍රී කාලයේ දී සක්‍රීය වේ.



පිළා කෝෂය

තද තැඹිලි පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැයක් ගනී. සෙ.ම. 1.5 - 2 ක් පමණ දිග වේ. පහසුවෙන් පියවී ඇසට හඳුනා ගත හැකිය.



ක්‍රමයක් සලකා

සෙ.ම. 3-5 ක් පමණ දිග වේ. ඉදිරිපස පියපාත්ත තද දුඹුරු කීට කළු පැහැයෙන් යුක්ත වේ. පියපාත්ත අවසානයේ අක්‍රම-වත් පටියක් හා ඉදිරියේ බොංචි හැඩති සලකුණක් දැකිය හැක.

දේවාපිල් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බෝග පත්‍රිකාව

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කාමිනාශක

- ★ මෙම පළිබෝධකයා පාලනයට අරතාපල් වගාව සඳහා රසායනික නිර්දේශයන් නිකුත් කර නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ කීටයන් අතින් අහුලා ඉවත් කිරීම.
- ❖ හුණුමලා සඳහා ආලෝක උගුල් භාවිතා කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කර දැමීම.
- ❖ හොඳින් ගැඹුරට සීඝ්‍රම කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍රයේ හා අවට වල් පැළෑටි මර්ධනය කිරීම.



රන් වන් කෝෂයේ වටපණුවා




හානි වූ ශාකයක්

ක්ෂේත්‍රයේ තැනින් තැන දුරවල වර්ධනයක් පෙන්වයි. පසුව ඒවා කහ වී සහ මැලේ ගයි.




මුල් වලට සවි වී ඇති කෝෂය

වර්ධනය අඩුවී ඇති ශාක ගලවා බැලූවිට ඉතා කුඩා සුදු / රන්වන් පැහැති තිත් වැනි කෝෂය දැකිය හැක.



කෝෂය

රන්වන් පැහැතිය. මි.මි. 0.5 - 0.9 අතර වේ. මේ තුළ බිත්තර ඇත. කෝෂයක පස තුළ වසර ගණනාවක් උවද විනාශ නොවී පැවතිය හැක.



පිපිරී ගිය කෝෂය

පිපිරීමේදී වටපණුවන් 400 - 500 ක් පමණ පිටවේ.

දේශපාලීය වශයෙන් රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

රජ වත් කෝෂය වටපනුවා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

★ මේ සඳහා නිර්දේශිත වටපනුනාශක නැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ පෙර කන්නයේ හානිය තිබූ ක්ෂේත්‍රවල පස් පරික්ෂාවක් සිදු කර වටපනු ගහනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම.
- ❖ වගාව ඉවත් කළ විගස හෙක්ටයාරයට 70% ක්ලෝරින් කුඩු කි.ග්‍රෑ. 35 ක් පසට යොදා හොඳින් මිශ්‍ර කර හොඳින් ජල සම්පාදනය කිරීම (ක්ලෝරින් ප්‍රතිකාර කිරීම).
- ❖ සුළු වශයෙන් ආසාදනය වී ඇති ක්ෂේත්‍ර සඳහා වසර 2 හෝ 3 පුරන් කිරීම සහ අධිකව ආසාදනය වී ඇති ක්ෂේත්‍ර සඳහා වසර 5 හෝ 7 පුරන් කිරීම
- ❖ අර්තාපල් හෝ සොලනෙසියස් කුලයට අයත් බෝග කන්න 3 ක් වත් වගා නොකිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ හොඳින් බිම් සැකසීම.
- ❖ සහතික කරන ලද බීජ අර්තාපල් භාවිතා කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍රය අවට ආසාදිත ක්ෂේත්‍ර ඇත්නම් එම ක්ෂේත්‍ර වලින් සතුන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීම.
- ❖ බෝග මාරුව අනුගමනය කිරීම (සොලනෙසියස් කුලයට අයත් නොවන බෝග සමඟ)
- ❖ ශ්‍රේණිගත කිරීම, සැකසීම හෝ ගබඩා කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඉවතලන අර්තාපල් හෝ අපද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයට නොදැමීම.

වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න



සුභ උරා බෝග නාමය



නානියට ලක් වූ පත්‍රයක්

කෘමීන් සුභ උරාබීම නිසා කොළ සහ කඳුන් විකෘති කරයි. වර්ධනයට බාධා ඇති කරයි. පත්‍ර මත තෙතවැටික ලප ඇති කරයි.



පැළ මැස්සා

ම.ම. 1ක් පමණ දිග වේ. සිහින් දිගටි කහ සිට තද දුම්රු දක්වා වර්ණ පරාසයක් දරයි. පත්‍ර යටි පැත්තේ දැකිය හැක.



කුඩ්දන්ත

රෝස සහ කොළ කළු වැනි වර්ණ ගනී. පියාපත් සහිත හා රහිත අවස්ථා ඇත. පත්‍ර යටි පැත්තේ සහ අංකුර වල දක්නට ලැබේ.



සුදු මැස්සා

සුදු පැහැති. දිග ම.ම. 1 - 2 ක් පමණ වේ. පත්‍ර වල යටි පැත්තේ දැකිය හැකිය.

දේවාපල් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා බෝංචි කෘෂි

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කාමිනාශක පැල මැකකා / කුඩිත්තා

කාමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ඉම්ඩාක්ලොප්‍රිඩ් 200 g/l SC	මි.ලී. 08
ඉම්ඩාක්ලොප්‍රිඩ් 70% WG	ග්‍රෑම් 02
ක්ලෝරන්ට්‍රානිලිප්‍රෝල් 20% + තයාමෙතොක්කම් 20% WG	ග්‍රෑම් 05
තයෝකයික්ලොම් (හයිඩ්‍රජන් ඩික්කල්ට්) 50% SP	ග්‍රෑම් 40
පයිමෙට්‍රොක්සින් 50% WG	ග්‍රෑම් 08
ලිපරොනිල් 50 g/l SC	මි.ලී. 16
නියාක්ලොප්‍රිඩ් 240 g/l SC	මි.ලී. 04
කාබොක්සල්ෆාන් 200 g/l SC	මි.ලී. 32
කාබොක්සිලික් ඇසිඩ් - පොටෑසියම් සෝල්ට් 479.8 g/l EW	මි.ලී. 160

සුදු මැකකා

කාමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
නියාක්ලොප්‍රිඩ් 240 g/l SC	මි.ලී. 04
ක්ලෝරන්ට්‍රානිලිප්‍රෝල් 20% + තයාමෙතොක්කම් 20% WG	ග්‍රෑම් 05
තයෝකයික්ලොම් (හයිඩ්‍රජන් ඩික්කල්ට්) 50% SP	ග්‍රෑම් 40
පයිමෙට්‍රොක්සින් 50% WG	ග්‍රෑම් 08

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ ඇලෙන උගුල් භාවිතා කිරීම.
- ❖ පත්‍රවල යටි පැත්ත හොඳින් සේදී යන සේ ජලය යෙදීම.
- ❖ රෙපව පාලන ක්‍රම යොදා ගැනීම.
- ❖ කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය යෙදීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම.



වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

පශ්චිම අංගමාර රෝගය



ආසාදිත පත්‍රයක් (උඩුපැත්ත)

තෙත සහිත දුඹුරු හෝ කළු පැහැති පැල්ලම් හටගනී.



ආසාදිත පත්‍රයක් (යටිපැත්ත)

පත්‍රයේ පැල්ලම් ඇති ස්ථානයේ යටි පැත්තේ සුදු පැහැති පුස් ස්වභාවයක් හටගනී.



ආසාදිත ශාකයක්

කඳේ දුඹුරු හෝ කළු පැල්ලම් හටගනී.



ආසාදිත අලයක්

රෝගය දරුණු අවස්ථාවේ දී අල වලට රෝගය පැතිරී අල ඇතුළත දුඹුරු පැහැයේ.

අර්තාපිල්ල විග්‍රහ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පශ්චිම අංගමාර රෝගය

රසායනික කාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
මැන්කොසේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 75% WG *	ග්‍රෑම් 32
ඒලුචිකිනාම් 500 g/l SC *	මි.ලී. 08
ක්ලෝරෝකලෝනිල් 500 g/l SC *	මි.ලී. 48
ක්ලෝරෝනාලෝනිල් 75 % WP *	ග්‍රෑම් 32
ප්‍රොපිනේබ් 70% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැනේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP * *	ග්‍රෑම් 40
මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් එම් 4% WG * *	ග්‍රෑම් 40
මැන්කොසේබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝප් 9% WP * *	ග්‍රෑම් 80

* ස්පර්ශක දිලීර නාශක - අඩු ආසාදන තත්ව යටතේ
 ** සංස්ථානික දිලීර නාශක - වැඩි ආසාදන තත්ව යටතේ

දිලීරනාශකය ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

මෙටිරාම් 55% + පයිරෝක්ලොස්ට්‍රොබින් 5% WG * *	ග්‍රෑම් 32
අකොසික්ට්‍රිබින් 250 g/l SC * *	මි.ලී. 16
ප්‍රොපමොකාබ් 607 g/l SL *	මි.ලී. 64
අයිසොප්‍රොතියොලෝන් 400 g/l EC *	මි.ලී. 40
මැන්ඩිප්‍රොපම්බ් 5% + මැන්කොසේබ් 60% WG *	ග්‍රෑම් 48

වළක්වා ගැනීම

- ❖ ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම.
- ❖ නිරෝගි බීජ අරතාපල් භාවිතා කිරීම.
- ❖ නියමිත කාලයේදී වගාව ස්ථාපිතය කිරීම.
- ❖ වගාව අවසන් වූ පසු බෝග අවශේෂ වගා භූමියෙන් ඉවත් කිරීම.



පූර්ව අංගවාර රෝගය



මුල් අවස්ථාවේ ආකෘති තහයක්

පළමුව තද කළු පැහැති කුඩා රවුම් ලප පත්‍ර මත ඇතිවේ.



පසු අවස්ථාවේ ආකෘති තහයක්

පසුව ඒවා විශාලවේ. නාරටි අතර පමණක් විසිරී යයි.



රෝග ලපයක්

පත්‍ර මත ලප වලඟකාර රටාවක් පෙන්වයි.



ආකෘති ගෘහයක්

රෝගය දරුණු වූ විට පත්‍ර කහ පැහැති වේ. පසුව පත්‍ර විශ්ලී යයි.

අර්තාපිල්ල වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පුර්ව අංගමාර රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීර නාශක

දිලීර නාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
මැන්කොසේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 75% WG *	ග්‍රෑම් 32
ෆ්ලුවිකිනාම් 500 g/l SC *	මි.ලී. 08
ක්ලෝරෝතලෝනිල් 500 g/l SC *	මි.ලී. 48
ක්ලෝරෝතලෝනිල් 75% WP *	ග්‍රෑම් 32
ප්‍රොපිනේබ් 70% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැනේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP * *	ග්‍රෑම් 40
මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් එම් 4% WG * *	ග්‍රෑම් 40
මැන්කොසේබ් 60% + ඩිෆිමෙතොමෝෆ් 9% WP * *	ග්‍රෑම් 80

දිලීර නාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
මෙටිරාම් 55% + පයිරොක්ලොප්‍රොබික් 5% WG * *	ග්‍රෑම් 32
ඩිෆිමෙතොනකෝල් 250 g/l EC * *	මි.ලී. 24
අයිසොප්‍රොකියලෝන් 400 g/l EC * *	මි.ලී. 40
කැප්ටාන් 50% WP * *	ග්‍රෑම් 32
කැප්ටාන් 80% WG * *	ග්‍රෑම් 20

වළක්වා ගැනීම

- ❖ සොලනෙසියේ කුලයේ බෝග (බටු, මිරිස්, තක්කාලි) හැර වෙනත් බෝග සමඟින් බෝග මාරුව සිදු කිරීම
- ❖ වගාව අවසන් වූ පසු බෝග අවශේෂ වගා භූමියෙන් ඉවත් කිරීම
- ❖ වගාව අවට ධාරක වල් පැලෑටි ඉවත් කරන්න

* ස්පර්ශක දිලීර නාශක - අඩු ආසාදන තත්ව යටතේ
 * * සංස්පර්ශක දිලීර නාශක - වැඩි ආසාදන තත්ව යටතේ



වියළි කුණු වීම හා ඵයුසේරියානු වැළවීමේ රෝගය




ආකෘතිගත ශාකයක්

පත්‍ර පිලිස්සී ගිය ස්වභාවයක් පෙන්වයි.




ආකෘතිගත ශාකයක්

පත්‍ර කහ පැහැ වී රෝල වී දුර්වල වර්ධනයක් ද පෙන්වයි.



ආකෘතිගත අලයක් (බාහිර)

පළමුව ගිලුණු විශලිත පැල්ලම් ඇති වේ. පසුව විශලිත කුණුවීමක් සිදුවේ. පිරි පොත්ත ඇතුළුව ගිලී ගත අතර මතුපිට වලඟාකාර රටාවකට රැලි වැටී යයි.



ආකෘතිගත අලයක් (ඇතුළත)

අලය තුළ සුදු පැහැයට පුස් වර්ධනය වේ.

දේශීයවත් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

වියළි කුණු වීම හා අසූර්යාලයේ වැළවීමේ රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

ක්ෂේත්‍රයේ දී

දිලීරනාශකය	දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
තයෝපනේට් මෙතිල් 50% + තිරාම් 30% WP	ග්‍රෑම් 50 / ජලය ලීටර් 50 / වර්ග මීටර් 10 කට
පෙන්සිනියුරෝන් 25% WP	ග්‍රෑම් 70 / ජලය ලීටර් 50 / වර්ග මීටර් 10 කට
තිරාම් 80% WP	ග්‍රෑම් 100 / ජලය ලීටර් 50 / වර්ග මීටර් 10 කට
කාබෙන්ඩිසෝල් 50% WP	ග්‍රෑම් 70 / ජලය ලීටර් 50 / වර්ග මීටර් 10 කට

✱ පස තෙත්වන ලෙස යෙදීම සඳහා.

බීජ අරතාපල් ගබඩාවේදී

දිලීරනාශකය	අල කිලෝ 1000 කට
තයෝපනේට් මෙතිල් 50% + තිරාම් 30% WP	කි. ග්‍රෑ. 01

වළක්වා ගැනීම

- ❖ නිරෝගී බීජ අරතාපල් වගාව සඳහා යොදා ගැනීම.
- ❖ වෙනත් බෝග (ගෝවා, තෝකෝල්, බ්‍රොකොලි, රාබු වැනි බෝග) සමග බෝග මාරුව.
- ❖ බීජ සඳහා ගබඩා කිරීමේදී යාන්ත්‍රික හානි වූ බීජ නොගැනීම.



බැක්ටීරියානු හිටු මැරීමේ රෝගය




ආකූලිත ගතයක්

ආරම්භක රෝග ලක්ෂණ වන්නේ තනි අතු හෝ අතු කිහිපයක් සුළු වශයෙන් මැලවීමයි.



රෝගය හඳුනා ගැනීම

කළු කපා ජලයට දැමූ විට සුදු පාටට බැක්ටීරියා ඉවල පිටවේ.



ආකූලිත අලයක්

අලයේ ඇස් වලින් කිරි පැහැති බැක්ටීරියා ඉවල පිටවේ.



කැපූ ආකූලිත අලයක්

අලයේ හරස්කඩ කිරි පැහැති ඉවලයක් පිට වීම දැකිය හැක. දුම්රු පාට වලයක් පසුව සැඟේ.

දීර්ඝාපේක්ෂ වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බැක්ටීරියානු හිටු මැරීමේ රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත රසායනික

- ★ මේ සඳහා නිර්දේශිත රසායනික නැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ රෝගී ගස් ගලවා විනාශ කිරීම හා එම ස්ථාන වල සිට වගාවේ අනෙකුත් ස්ථාන වලට ගලා නොයන සේ ජලය යෙදීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගා සඳහා නිරෝගී බීජ යොදා ගැනීම.
- ❖ අවම වශයෙන් වසර 3ක වත් පෙර කන්නයේ රෝග පැවති බිම් වගාවට යොදා නොගැනීම.
- ❖ අවම වශයෙන් වසර 3 ක් පමණ සොලනෙසියේ කුලයට අයත් බෝග වගා කළ බිමක් වගාවට යොදා නොගැනීම.



මෘදු කුණු වීම හා කළු හඳ රෝගය



ආසාදිත අලයක්

ගබඩාටේදී අර්තාපල් අල දුගඳක් සහිතව මෘදු ස්වභාවයකින් යුත්තව කුණාටේ.




ආසාදිත ශාකයක්

පත්‍ර කහ පැහැ වීම, උඩු අතට පත්‍ර රෝල වීම, ගස් මලෙව් ගාම ද විය හැක.



ආසාදිත ශාකයක්

ගස් පාමුල කළු පැහැති වීම හා තෙත් ස්වභාවයකින් කුණාටී යයි.



ආසාදිත ශාකයක කඳක්

කඳ තුල කළු පැහැති කුහරයක් ලෙස කුණාටී යයි.

දේවාපල් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

මතද කුණු වීම හා කළු පාද රෝගය

රසායනික කාලනය - නිර්දේශිත දිලීරනාශක

- ★ මේ සඳහා නිර්දේශිත දිලීරනාශක නැත.

වෙනත් කාලන ක්‍රම

- ❖ රෝගී ගස් පස් සමග ගලවා ඉවත් කිරීම
- ❖ එම ස්ථාන වල සිට වගාවේ අනෙකුත් ස්ථාන වලට ගලා නොයන සේ ජලය යෙදීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ හොඳින් ජලය බැස යන ලෙස වගාවේ ජල වහනය සැකසීම.





**ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ හිමරේදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

www.safe.doa.gov.lk