

එක්කෝලි එලෑව

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

රූපමය කාඩ් පත්



ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ හිවැරදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

www.safe.doa.gov.lk



භූක්ෂිකාරී වගාව

රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



තාක්ෂණික දායකත්වය

- ❖ ටී. කේ. ඒ. අයි. හජ්ජි - ප්‍රාදේශීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, බිණ්ඩාරවෙල
- ❖ එච්. ඒ. එස්. එන්. හෙට්ටිආරච්චි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සිතාවලිය
- ❖ එම්. එස්. ඩබ්ලිව්. ප්‍රනාන්දු - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ ආචාර්ය ජී. එච්. රණවීර - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව
- ❖ කේ. පුෂ්පාංජි - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය, සිතාවලිය
- ❖ ආචාර්ය ජේ. ජී. මාර්කින්ඩ - පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය, පේරාදෙණිය

සැකසුම

- ❖ ජී. එස්. ජී. තෙන්නකෝන් - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව
- ❖ කේ. ඒ. යූ. එන්. එන්. බිණ්ඩාර - ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නෝරුව



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පේරාදෙණිය
2024

නිෂ්පාදි ගෙඩි හා පත්‍ර කෘතීමය



හානි වූ පත්‍රයක්

කීටයන් පත්‍ර මධ්‍යයේ පටක කා දමයි. හානිය අධික වූ විට පත්‍ර ඉවත දැමිය යුතුය.




හානි වූ ගෙඩියක්

කීටයන් ප්‍රථමයෙන් ඉදහිසින් පිටතට ඇතුළත් වී කොටස් ආහාරයට ගනී. පිටතට මලපහ ගෙඩිවල නටුව ආසන්නයේ දැකගත හැක.



කීටයා

නොමේරු කීටයන් ම.ම. 0.5 ක් පමණ දිග වේ. ඉහත හෝ කොළ පැහැයේ. පරිණත කීටයන් ම.ම. 7ක් පමණ වේ. කොළ-රෝස පැහැය වේ. නිස පිටුපසට වන්නට වර්ධනය වන අදුරු පටියක් ඇත.



කුහුඹුල් සලකා

ම.ම. 5-7 ක් පමණ වේ. දුඹුරු-අළු පැහැයට හුරු සලකායෙකි. දිවා කාලයේදී පත්‍ර අතර සැඟවී සිටින අතර රාත්‍රියට සක්‍රීය වේ.

නිෂ්පාදි වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

තත්කාලී ගෙඩි හා පත්‍ර කෘතීමය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ස්පිනොටොරාම් 25% WG	ග්‍රෑම් 4
එම්එක්ටීන් ඩෙන්කොපීටී 5% SG	ග්‍රෑම් 6
ඇඩමැක්ටීන් 18 g/l EC	මි.ලී. 10
ඉන්ඩොක්සකාර්බී 150 g/l EC	මි.ලී. 6

- ★ ප්‍රතිරෝධීතාවක් දැකිය හැකි බැවින් එකම කෘමිනාශකය දිගින් දිගටම යෙදීමෙන් වළකින්න. එකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම සමග භාවිතා කරන්න.

වෙනත් පාලන ක්‍රම


- ❖ මුල් අවස්ථාවේ හානිකල කොළ, ගෙඩි සහ අනෙකුත් කොටස් දිනපතා ඉවත් කර විනාශකිරීම.
- ❖ සුහුඹුලන් අඩු කිරීම සඳහා බල්බ උගුල්, ගෙරමෝන් උගුල් හෝ ඇලෙන උගුල් භාවිතා කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ නිරෝගී ගුණාත්මක පැළ භාවිතා කිරීම.
- ❖ බෝග මාරුව අනුගමනය කිරීම (සොලනේසියස් කුලයට අයත් නොවන බෝග සමග).
- ❖ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාවට නැවත භාවිතා කරන වගා මාධ්‍ය ජීවානුභරණය කිරීම.



නාඤ්ඤාලී ගෙඩි විදින දළඹුවා



හානි වූ ගෙඩි

දළඹුවන් ගෙඩි වල රවුම් හැඩැති සිදුරු ඇති කරමින් ඇතුළු අභ්‍යන්තරය ආහාරයට ගනී. හානිකල ගෙඩි ඉක්මනින් ඉඳි පසුව කුණා වේ. ළපටි පත්‍ර හා මල්ද ආහාරයට ගැනීමෙන් ඒවාද හානිවේ.

කීටයා

වැඩුණු කීටයන් කහ-කොළ පැහැ ගනී. සෙ.ම. 2.5 ක් පමණ වේ. ශරීරයේ දෙපස දික් අතට දුමුරු පැහැයට හුරු තද සහ ලා පාට ඉරි ඇත.

හුණමුල් සලකිත

ම.ම. 14-18 පමණ දිගය. පිරිමි සලකිත කොළ පැහැති අළු සහ ගැහැණු සලකිත තැඹිලි - දුමුරු පැහැ ගනී. පුර්ව පිඟපත්වල කළු ලපයක් ඇත. සුදු පැහැ අපර පිඟපත්වල දාර කළු පැහැ වේ. රාත්‍රී කාලයේදී සක්‍රීය වේ.

නිකුත්වීම් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

තත්කාලී ගෙඩි විදින දළඹුවා

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කාමිනාශක

කාමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
ක්ලෝරිනේට්/නිලිකේෂ 200 g/l SC	මි.ලී. 4
ආලෝකනිශ්චයකර 24% WG	ග්‍රෑම් 5
නොවැලියුරෝන් 100 g/l EC	මි.ලී. 16
ක්ලෝරිනේට්/නිලිකේෂ 50 g/l EC	මි.ලී. 24
ආලෝකනිශ්චයකර 20% WG	ග්‍රෑම් 6

★ මල් පිපෙන අවධියේදී යොදන්න. අවශ්‍ය නම් දින 10-14 කින් එල හට ගැනීමේ දී නැවත යොදන්න.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ මුල් අවස්ථාවේ හානිකල ගෙඩි ක්ෂේත්‍රයෙන් දිනපතා ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- ❖ සුහුඹුලත් අඩුකිරීම සඳහා බල්බ උගුල්, ගෙරමොන උගුල් භාවිත කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ නිරෝගී ගුණාත්මක පැල භාවිතා කිරීම.
- ❖ බෝග මාරුව අනුගමනය කිරීම (සොලනේසියස් කුලයට අයත් නොවන බෝග සමග).



වඩා විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

පත්‍ර කෘතීමය



හානි වූ පත්‍ර

කීටයන් පත්‍ර අභ්‍යන්තර කොටස් ආහාරයට ගැනීම නිසා සිහින් සුදු පැහැති රටාවන් ඇති වේ.



හානි වූ ශාක

අධික ලෙස හානිය ඇති වීට පත්‍ර විශළී යයි.



කීටයා

අත් කාළයක් ආධාරයෙන් පත්‍ර හොඳින් නිරීක්ෂණය කළහොත් කීටයා සජීවී නම් ශරීරය කහ පැහැතිව උමග තුළ එහා මෙහා සෙළවෙනු ද කීටයා අජීවී නම් දුර්වර්ණ සිරුරක් සහිතව ද දැකගත හැක.



නුහුඹුල් මැස්සා

මු.ම. 2 ක් පමණ දිග කළු පැහැ මැස්සෙකි. ඇස් දෙක අතර ප්‍රදේශය කහ පැහැතිව.

නිකුත්වීම් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පත්‍ර කහිඳිත

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

කොහොඹ ඇට නිෂ්කාරකය

ග්‍රෑම් 640

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ හානි වූ පත්‍ර කපා විනාශ කිරීම.
- ❖ ඇලෙන උගුල් භාවිතා කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ ආසාදිත වගාවන් ආසන්නයේ නව වගා ආරම්භ කිරීමෙන් වැළකීම.



වැඩි විස්තර සඳහා මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

මුල ගැටිති වටපණුවන්



කහි වූ ශාක

පත්‍ර කුඩා වීම හා කහ වීම සිදුවේ. ශාකය මැළුවුනු ස්වභාවයක් පෙන්වයි. වර්ධනය බාල වී කුරුවේයි.



කහි වූ මුල්

මුල්වල ගැටිති දැකිය හැක. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ශාක රෝගකාරකයෙකු හේතුවේ.

නිකුත් වූ විට රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම



මූල ගැටිති වටපණුවන්

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක

- ❖ නිර්දේශිත වටපණුනාශක නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම



- ❖ හානි වූ ශාක ගලවා පසුත් සමග ඉවත් කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාවට පෙර සත්හෙමිප් හෝ අඛ සිටුවා ඒවා පසට මිශ්‍ර කිරීම.
- ❖ තවත් සඳහා භාවිත කරන පස හොඳින් ජීවානුභරණය කිරීම.
- ❖ ගැඹුරට සීඝ්‍ර පස හිරු එළියට නිරාවරණය වීමට ඉඩහැරීම.
- ❖ නිරෝගී පැල වගාව සඳහා යොදා ගැනීම.
- ❖ දීර්ඝ පවත්වා ගැනීමට කාබනික හා රසායනික පොහොර නියමිත පරිදි යෙදීම.
- ❖ මූල ගැටිති වටපණු භානියට පාත්‍ර නොවන බඩ ඉරිඟු, කවිපි වැනි බෝග සමග බෝග මාරුව



යුෂ උරාබොහ කෘමිවෘත්තීය (හළු මැක්කා, කුඩින්නා, සුදු මැක්කා)



පැළුමැක්කන්ගේ කෘතිය

සිහින් ම. ම. 1 ක් පමණ දිග කහ-දුඹුරු පාට වේ. වේගයෙන් එහා මෙහා යයි. පත්‍රවල යටි පැත්තේ සිට යුෂ උරා බෝයි. පත්‍ර තලයේ ඊළිවත් සුදු තිත් දිස්වේ. තක්කාලි මැලේවීමේ වෛරස් රෝග වාහකයායි.

සුදු මැක්කන්ගේ කෘතිය

සුදු පැහැති. ම.ම. 1-2 ක් පමණ දිග වේ. පත්‍රවල යටිපැත්තේ සිට යුෂ උරා බෝයි. පත්‍ර කහ පැහැයට හැරී පත්‍ර කාර්පි පැහැදිලිවීමට පටන් ගනී. ශාකයේ වර්ධනය බාල වේ. කොළ කොඩි වීමේ වෛරස් රෝග වාහකයායි.

කුඩින්නන්ගේ කෘතිය

ම.ම. 1-1.5 පමණ වේ. පෙයාස් හැඩැති කොළ-කහ, කොළ-කළු හෝ රෝස පැහැති. පත්‍ර යටි පැත්තේ, කළේ හා අග්‍රස්ථ අංකුර වල ගතවාස ලෙස සිටීමත් යුෂ උරාබෝයි. පත්‍ර හා අග්‍රස්ථ අංකුර මැලේවීම, අක්‍රමවත් පත්‍ර ඇතිවීම, පත්‍ර හැකිලීම හා පත්‍ර මත දැලි පුස් ඇති වීම සිදුවේ. පිරිසිදුකිරීම වැළැක්වීම වෛරස් රෝග වාහකයායි.

නික්මුණු වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා විවිධ ආකාරයේ (පැළ මැස්සා, කුඩා, සුදු මැස්සා)

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත කාමිනාශක

කාමිනා	කාමිනාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
පැළ මැස්සා කුඩා කුඩා මැස්සා	පයිමෙට්‍රොක්සි 50% WG	ග්‍රෑම් 08
පැළ මැස්සා කුඩා කුඩා මැස්සා	නෙටෙක්සිම් කොල්ට් ෆැට් ඇසිඩ් 500 g/l EW	මි.ලී. 160
පැළ මැස්සා කුඩා කුඩා මැස්සා	ඉම්බික්ලොප්‍රික් 70% WG	ග්‍රෑම් 02
පැළ මැස්සා කුඩා කුඩා මැස්සා	ඉම්බික්ලොප්‍රික් 200 g/l SL	මි.ලී. 16
පැළ මැස්සා කුඩා කුඩා මැස්සා	තයාමෙතාක්කාම් 25% WG	ග්‍රෑම් 05
කුඩා කුඩා මැස්සා	තෙයොක්සික්ලොම් 50% SP	ග්‍රෑම් 40

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ ඇලෙන උතුල් භාවිතා කිරීම.
- ❖ පත්‍රවල යටි පැත්ත හොඳින් සේදී යන සේ ජලය යෙදීම.
- ❖ පෙපිල පාලන ක්‍රම යොදා ගැනීම.
- ❖ කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය යෙදීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ වගාව ස්ථාපනයට පෙර, පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ ඇත්නම් විනාශ කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් වල් මර්ධනය කිරීම.
- ❖ වගාව ස්ථාපිත කිරීමට පෙර සිටම වගා ක්ෂේත්‍රය වටා බාධක වැටක (කෘමි දැල්, බිඳුරු, කුරක්කන්, සෝගම් හෝ වෙනත් දූවක් මගින්) ස්ථාපිත කිරීම.
- ❖ ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම.
- ❖ බෝගයට පිදුරු හෝ පොලිතින් වසුන් යෙදීම.



ජූර්ව අංගමාර රෝගය



හානි වූ පත්‍රයක්

ඇතුළට ක්‍රමයෙන් කුඩාවන කළු පැහැති මුදු ආකාර වලයෙන් රාශියක් සහිත දුඹුරු පැහැති පුළුල් පත්‍රවල ඇතිවේ. පුළුල් වටා කහ පැහැති ප්‍රදේශයක් දැකිය හැකිය. මේරු පත්‍රවල පළමුවෙන්ම පුළුල් හටගන්නා අතර පසුව ඉක්මනින් ඉහළ පත්‍ර කරා ව්‍යාප්ත වෙයි. හානිය අධික විට සම්පූර්ණ පත්‍රයම කහ පැහැති ඉක්මනින් විශලෙයි.



හානි වූ ගෙඩියක්

ඉදිමට පෙර තද දුඹුරු පැහැති හිළුන ස්වභාවයෙන් යුත් පැළලම් ඇතිවේ.



හානි වූ ශාක

ආසාදනයේ පසු අවස්ථාවේදී පත්‍ර නටු මත හා කඳෙහි ද පුළුල් ඇතිවේ.

නික්කොල් වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

පුර්ව අංශමාර රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීර නාශක

දිලීර නාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
මැන්කොසේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 75% WG *	ග්‍රෑම් 32
අයිසොප්‍රොක්‍රිබ්‍රොන් 400 g/l EC **	මි.ලී. 40
ආලව්‍යනාම් 500 g/l SC *	මි.ලී. 16
ක්ලෝරොනලොක්‍රිල් 500 g/l SC *	මි.ලී. 48
ක්ලෝරොනලොක්‍රිල් 75% WP *	ග්‍රෑම් 32
ප්‍රොපිනේබ් 70% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැනේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP **	ග්‍රෑම් 40
මැන්කොසේබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝෆ් 9% WP **	ග්‍රෑම් 80

දිලීර නාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

මෙටිරාම් 55% + පයිරොක්ලොක්ප්‍රොඩින් 5% WG ** ග්‍රෑම් 32

අකොසිප්ට්‍රිබින් 120 + ටෙබුකොනකෝල් 200 g/l SC ** මි.ලී. 24

මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් - M 4% WG ** ග්‍රෑම් 40

කැප්ටාන් 50% WP ** ග්‍රෑම් 32

කැප්ටාන් 80% WG ** ග්‍රෑම් 20

ඩිලෙනකොනකෝල් 250 g/l EC ** මි.ලී. 24

වෙනත් පාලන ක්‍රම

❖ ආසාදිත ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

❖ සුදුසු කාලයේ වගාව ස්ථාපනය කිරීම.

❖ සිටුවීමට පෙර, පෙර කන්නයේ සියළුම ශාක අවශේෂ විනාශ කිරීම.

❖ වගා බිම ආවරණය වන සේ පිදුරු වැනි වස්තුකක් යෙදීම.

- * ස්පර්ශ දිලීර නාශක - අඩු ආසාදන තත්ව ඇති විට යෙදීම සඳහා
- ** සංස්ථානික දිලීර නාශක - වැඩි ආසාදන තත්ව ඇති විට යෙදීම සඳහා



නිෂ්පාදි පශ්චාත් ජංගමාරය




ආකෘති පත්‍රයක් (උඩුපත්ත)

තෙත සහිත දුම්රු හෝ කළු පැහැති පැළලම් හටගනී.



ආකෘති පත්‍රයක් (යටිපත්ත)

පත්‍රයේ පැළලම් ඇති ස්ථානයේ යටි පැත්තේ සුදු පැහැති ප්‍රස්ථ ස්වභාවයක් හට ගනී.



ආකෘති ගෘහයක්

කළු දුම්රු හෝ කළු පැළලම් හටගනී.



ආකෘති ගෙඩියක්

රෝගය දරාගැනීමට පෙළුම් දී ගෙඩි වලට රෝගය පැතිරී ගෙඩි ඇතුළත දුම්රු පැහැයට පත්වේ.

නිව්සාල වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

තත්කාලී පශ්චිම අංගමාරය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීර නාශක

දිලීර නාශකය	ජලය ලීටර් 16ක දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය
මැන්කොසේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 75% WG *	ග්‍රෑම් 32
ෆ්ලුවිසිනාම් 500 g/l SC *	මි.ලී. 08
ක්ලෝරෝනලෝනිල් 500 g/l SC *	මි.ලී. 48
ක්ලෝරෝනලෝනිල් 75% WP *	ග්‍රෑම් 32
ප්‍රොසිනේබ් 70% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැනේබ් 80% WP *	ග්‍රෑම් 32
මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP **	ග්‍රෑම් 40
මැන්කොසේබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝෆ් 9% WP **	ග්‍රෑම් 80
මෙටිරාම් 55% + පයිරොක්සලොක්ප්‍රොබික් 5% WG **	ග්‍රෑම් 32

දිලීර නාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

අකොසිප්‍රිබ් 250 g/l SC ** මි.ලී. 16

මැන්කොසේබ් 64% + මෙටලැක්සිල් - M 4% WG ** ග්‍රෑම් 40

ප්‍රොපමොකාබ් 607 g/l SC * මි.ලී. 64

අයිසොප්‍රොනියලෝන් 400 g/l EC ** මි.ලී. 40

ඩිෆෙන්කොනෝල් 250 g/l EC ** මි.ලී. 24

වෙනත් පාලන ක්‍රම

❖ වගාවේ ආසාදනය පළමුවෙන්ම දැඩි අවස්ථාවේදීම ආසාදිත ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ පෙර කන්නයේ බෝග අවශේෂ විනාශකිරීම.
- ❖ නියමිත කාලයේදී වගාව ස්ථාපනය කිරීම.

* ස්පර්ශ දිලීර නාශක - අඩු ආසාදන තත්ව ඇති විට යෙදීම සඳහා
** සංස්ථානික දිලීර නාශක - වැඩි ආසාදන තත්ව ඇති විට යෙදීම සඳහා



දඹුරු පැල්ලම් රෝගය



ආකෘතින පත්‍රයක් (යටිපත්ත)

පත්‍ර ගව් පැත්තේ අළු දඹුරු පැහැති පැල්ලම් ඇති වේ. ඒවා පසුව විශාල වී සීගළු පත්‍ර වලට පැතිරේ, පත්‍ර මතුවී දඹුරු පැහැ වී විශළී ගති.



ආකෘතින පත්‍රයක් (උඩුපත්ත)

තරමක් මේරු පත්‍ර මතුවී ලා කොළ/කහ පැහැයට හුරු අඟුමවත් දාරයක් සහිත පැල්ලම් ඇති වේ.

නිකුත්වී වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

දඹුල්ල හැඳවුම් රෝගය

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත දිලීර නාශක

දිලීර නාශකය

ජලය ලීටර් 16ක
දිය කළ යුතු ප්‍රමාණය

ක්ලෝරෝතලෝනිල් 500 g/l SC

මි.ලී. 48

තයෝලනේට් - මෙතිල් 70% WP

ග්‍රෑම් 16

ක්ලෝරෝතලෝනිල් 75% WP *

ග්‍රෑම් 32

වෙනත් පාලන ක්‍රම

❖ භානිය දුටු වහාම රෝගී ශාක කොටස් ඉවත්කර විනාශ කිරීම.



වඩා විස්තර තද්‍රව්‍ය මෙම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

වෛරස් රෝග

(නක්කාලි මැලුවීමේ වෛරස් රෝගය, පිපිඤ්ඤා විවික්ඛ වෛරස් රෝගය, කැරලිටොප් වෛරස් රෝගය, කොල කොඩිවීමේ වෛරස් රෝගය)



පැළ මැක්කන් මගින් ව්‍යාප්ත වන නක්කාලි මැලුවීමේ වෛරස් රෝගය සහිත පත්‍ර

වැඩෙන පත්‍රවල අග්‍රස්ථ විශළී යයි. උවුම් හැඩැති රතු-කහ පැළලම් හට ගැනීම නිසා පත්‍ර තඹ පැහැයවේ. මේරූ පත්‍ර කහ පැහැයේ. කඳෙහි හා නටුවල තද පැහැති ඉරි හට ගනී. ගෙඩි මත කොළ, කහ හෝ රතු පැහැති තරමක් ඉස්සුන ස්වභාවයේ ඉලිප්පාකාර පැළලම් හට ගනී.



කුඩින්තන් මගින් ව්‍යාප්ත වන පිපිඤ්ඤා විවික්ඛ වෛරස් රෝගය සහිත පත්‍ර

රෝගී ශාකවල පත්‍රවල මද වශයෙන් කොළ පැහැති පැළලම් ආකාරයේ ස්වභාවයක් හෝ පත්‍රිකා සිහින් වී නාරටි පමණක් පෙන්නුම් කරන තත්වයක් දීස්වේ. පත්‍ර දිග නොහැරෙන තත්වයක් හා පත්‍රිකා හැකිලී ශාමද සිදුවිය හැක.



පත්‍ර කිඩැවෑන් මගින් ව්‍යාප්ත වන කැරලිටොප් වෛරස් රෝගය සහිත පත්‍ර

පත්‍ර දුඹුරු පැහැ වේ. උඩු අතට හැකිලේ. නාරටි දම් පැහැයට හැරේ. පත්‍ර ඝන වී කැඩෙන සුළු වේ. ගෙඩි මත දුඹුරු පැළලම් ඇතිවේ. කුඩා කාළයේදී වැළදුනහොත් පැළ මියයයි. වැඩෙන පැළ වලට වැළදුන විට ශාක කුරු වේ.



සුදු මැක්කන් මගින් ව්‍යාප්ත වන නක්කාලි කොළ කොඩිවීමේ වෛරස් රෝගය සහිත ශාකයක්

රෝගී ලක්ෂණ පළමුව ළපටි පත්‍රවල හටගනී. පත්‍ර කුඩා වෙයි. පත්‍රවල නාරටි අතර ප්‍රදේශ කහ පාට වෙයි. පත්‍රිකා හැකිලෙයි. පාර්ශ්වික අංකුර විශාල සංඛ්‍යාවක් හට ගැනීම සහ මළවලින් ගෙඩි හට නොගනී. රෝගී ශාක කුරු වෙයි.

නික්කාලි වගාව රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

වෛරස් රෝග

(නක්කාබ් මැලුවීමේ වෛරස් රෝගය, පිප්පද්දා විවික්ඛ වෛරස් රෝගය,
කර්බුටොස් වෛරස් රෝගය, කොල කොබවීමේ වෛරස් රෝගය)

රක්‍ෂානීත පාලනය - නිර්දේශිත රක්‍ෂානීත

- ★ මෙම රෝගය සඳහා නිර්දේශිත රක්‍ෂානීත පාලනයක් නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ ආසාදිත පැළ ඉවත්කිරීම
- ❖ රෝග වාහකයන් පාලනයට කෘමිනාශක යෙදීම

වළක්වා ගැනීම

- ❖ සිටුවීමට පෙර, පෙර කන්නයේ සියළුම ශාක අවශේෂ විනාශ කිරීම
- ❖ රෝග වාහකයන්ගේ ධාරක ශාක වන වල්පැළෑටි පාලනය කිරීම
- ❖ නිරෝගී බීජ භාවිත කිරීම



බැක්ටීරියා හටු මැරීම



ආසාදිත ශාකයක්


ආරම්භක රෝග ලක්ෂණය වන්නේ තනි අතු හෝ අතු කිහිපයක් සුළු වශයෙන් මැළවී යාම

දින කිහිපයකට පසු මුළු ශාකයම හදිසසියයේ ස්ථිර ලෙස මැළවී යාම



රෝගය හඳුනා ගැනීම

කඳ කපා ජලයට දැමූ විට සුදුපාරිට බැක්ටීරියා ශ්‍රාවය පිටවේ.



ආසාදිත කඳ

ආසාදිත ගස්වල කඳ ඇතුළත දුඹුරු පාරි වේ.

නික්කිණිල් වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා මර්ධනය කිරීම

බැෂ්ටරියා හිටු මැරීම

රසායනික පාලනය - නිර්දේශිත රසායනික

- ★ මෙම රෝගය සඳහා නිර්දේශිත රසායනික පාලනයක් නොමැත.

වෙනත් පාලන ක්‍රම

- ❖ රෝගී ගස් ගලවා විනාශ කිරීම.
- ❖ රෝගී ගස් තිබූ ස්ථාන වල සිට වගාවේ අනෙකුත් ස්ථාන වලට ගලා නොයන සේ ජලය යෙදීම.

වළක්වා ගැනීම

- ❖ අවම වශයෙන් වසර 3ක් වත් පෙර කන්නයේ රෝග පැවති බිම් වගාවට යොදා නොගැනීම.
- ❖ අවම වශයෙන් වසර 3 ක් පමණ සොලනෙසියේ කුලයට අයත් බෝග වගා කළ බිමක් වගාවට යොදා නොගැනීම.





**ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළිබෝධනාශක සහ පොහොර
ආරක්ෂාකාරීව සහ හිමරේදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

www.safe.doa.gov.lk